

Référence selon le patron de lésions osseuses

Investigations préalables

- Antécédents
- Historique clinique
- Examen clinique
- Radiographie simple

Caractéristiques inquiétantes

Clinique

- Masse palpable
- Douleur profonde persistante
- Tableau symptomatique anormal

Imagerie

- Nouvelle formation osseuse
- Lésion Lytique
- Élévation périostée
- Gonflement dans les tissus mous
- Fracture pathologique
- Changement à la Rx de contrôle

Si **pas de symptômes** ou de signes de cancer ou âgé de **moins de 35 ans**:

- Formule sanguine complète
- Vitesse de sédimentation des érythrocytes
- Radiographie thoracique
- IRM

Aucune évidence de tumeur primaire osseuse agressive

Traiter localement selon le diagnostic

Si lésion unique

Tumeur osseuse primaire agressive suspectée

Référence prioritaire à un Centre de Traitement du Sarcome
(dans un délais de 2 semaines)

Histoire présente ou passée de **cancer** ou âgé de **plus de 35 ans**:

- Formule sanguine complète
- Immuno-électrophorèse des protéines
- Scan thoracique et abdominaux-pelvien
- Scintigraphie osseuse

Découverte de multiples lésions ou d'un autre cancer

Investigation et traitement local